

ЛАТИНСКА АМЕРИКА

Венецуела	1-12	Малария терциана (P.vivax) и тропика (P.falciparum) са разпространени в някои селски райони на щатите Амазонас, Анзоатегуи, Боливар и Делта Амакуро. По-нисък риск се отчита в Апуре, Монагас, Сукре и Зулиа. Опасността от малария тропика е по-голяма в джунглата на щатите Амазонас (Алто Оринокко, Атабапо, Агурсес, Аутана, Манапире) и Боливар (Келено, Ел Кадао, Херес, Гран Сабана, Пиар, Раул Леони, Роцио, Сифонтес и Сукре).	P.vivax (75%) P.falciparum (25%)	CHL, SP	CHL (II) MEF, MAL (IV) - в изброените рискови райони.
Гватемала	1-12	В местности под 1500м. Целогодишно. Среден е риска от заразяване с малария в департаментите Ескуинтла и Изабал и нисък в Агта Верапаз, Байа Верапаз, Чикимула, Петен, Сучитепекuez и Закапа.	P.vivax	-	CHL (II) - в рисковите райони.
Гвиана	1-12	Повсеместно във вътрешността на страната, като най-висок риск се наблюдава в региони 1, 2, 4, 7, 8, 9 и 10 и нисък риск в региони 3, 5 и 6. Спорадични случаи се наблюдават в гъсто населените места от крайбрежните райони.	P.falciparum 45% P.vivax 44% Смесени инфекции 10%	CHL	MEF, MAL (IV)
Еквадор	1-12	Целогодишно има риск в районите под 1500м, както съществува и умерена вероятност от трансмисия и в крайбрежните провинции. Не съществува риск в Гуайакул и Кuito и градовете в региона на Андите.	P.falciparum 13% P.vivax 87%	CHL, SP	MEF, MAL (IV) – за всички райони без Гуайакул и Кuito.